



**PIANO TERAPEUTICO AIFA PER LA PRESCRIZIONE DI
TOSSINA BOTULINICA DI TIPO A
(valido per un singolo trattamento
con obbligo di rivalutazione dopo 3 mesi)**

Centro prescrittore _____

Nome e cognome del Clinico prescrittore _____

Recapito telefonico _____

Paziente (nome, cognome) _____ Età _____

Sesso M ☐ F ☐ Codice fiscale (CF) _____

Indirizzo _____ Tel. _____

ASL di residenza _____ Medico curante (MMG) _____

Indicazioni inserite nell'elenco dei farmaci a carico del SSN ai sensi della L648/1996:

Pazienti adulti (≥ 18 anni) con:


- Spasticità, limitatamente alle forme non incluse nelle indicazioni autorizzate
- Iperidrosi palmare o facciale primaria persistente e severa che interferisce con le normali attività quotidiane o con i rapporti sociali
- Distonie focali e segmentarie, limitatamente alle forme non incluse nelle indicazioni autorizzate

Il farmaco è controindicato nei seguenti casi:

- presenza di infezione nella sede di somministrazione
- ipersensibilità nota alla tossina botulinica di tipo A o a uno qualsiasi dei suoi eccipienti;
- soggetti con disordini della giunzione neuromuscolare (es. miastenia grave o sindrome di Lambert-Eaton)

L'uso del farmaco non è raccomandato:

- soggetti con storia di disfagia o di difficoltà respiratorie
- soggetti con diagnosi di malattia neuromuscolare



- gravidanza (non ci sono dati sull'utilizzo della tossina botulinica di tipo A nella donna in gravidanza; studi sugli animali in riproduzione hanno dimostrato tossicità per cui la tossina botulinica di tipo A andrebbe evitata in gravidanza a meno che non sia strettamente indispensabile)

- allattamento (non vi sono informazioni se la tossina botulinica di tipo A sia escreta nel latte materno per cui l'uso durante l'allattamento non può essere raccomandato)

Cautela se:

- contemporanea somministrazione di aminoglicosidi o spectinomycin o di agenti in grado di interferire con la trasmissione neuromuscolare (es. composti curaro-simili)

Altre condizioni da osservare:

-Prescrizione specialistica:

neurologo con esperienza nell'uso della tossina botulinica
fisiatra con esperienza nell'uso della tossina botulinica
ortopedico con esperienza nell'uso della tossina botulinica
oculista con esperienza nell'uso della tossina botulinica

- Le unità di tossina botulinica non sono intercambiabili da un prodotto all'altro a base di tossine botuliniche

- Adeguata informazione al paziente relativamente alla necessità di rivolgersi immediatamente a un medico se si manifestano disturbi della deglutizione, della parola o della respirazione.

Diagnosi:

☐ Spasticità, limitatamente alle forme non incluse nelle indicazioni autorizzate.

Specificare: _____

☐ Iperidrosi palmare o facciale primaria persistente e severa che interferisce con le normali attività quotidiane o con i rapporti sociali

☐ Distonie focali e segmentarie, limitatamente alle forme non incluse nelle indicazioni autorizzate.

Specificare: _____

☐ Prima somministrazione

☐ Somministrazioni successive

Prodotto utilizzato:

☐ Botox

☐ Dysport

☐ Xeomin


Dose utilizzata: _____

Data di somministrazione: _____

Intervallo di tempo intercorso dall'ultima somministrazione: _____

Se non sono trascorsi almeno 3 mesi dall'ultima somministrazione il farmaco NON può essere somministrato

Controllo a tre mesi:



Il pz prosegue il trattamento?

- ☐ SI
☐ NO

Se il trattamento è sospeso:

motivo della sospensione

- ☐ Mancata efficacia
☐ Reazioni avverse (specificare) _____
☐ Altro (specificare) _____

Data ____/____/____

Timbro e firma del clinico prescrittore