

EPATITE B (HBV)

Cos'è?

È una malattia contagiosa che colpisce il fegato, causata dal virus HBV.

Come si trasmette?

Il virus HBV si trova nel sangue e altri liquidi organici, in particolare nelle secrezioni genitali. La trasmissione avviene con il rapporto sessuale (vaginale, anale, oro-genitale) non protetto o per contatto della cute lesionata con sangue infetto (anche in piccole quantità). Ciò si può verificare mediante lo scambio di siringhe o altri strumenti utilizzati per la preparazione e somministrazione di sostanze stupefacenti o l'utilizzo di strumenti (ad esempio per la pratica di tatuaggi e piercing) non adeguatamente sterilizzati.

Come si manifesta?

L'infezione acuta può essere asintomatica o si può manifestare con sintomi poco specifici stanchezza, inappetenza, malessere generale, febbre, nausea. Talvolta compare l'ittero; (colorazione gialla della pelle, delle mucose e delle sclere – la parte bianca dell'occhio –). In circa il 5% dei casi può divenire cronica con rischio di evoluzione in cirrosi epatica e tumore del fegato.

Dopo quanto tempo compaiono i segni e i sintomi?

I sintomi compaiono dopo 45 – 180 giorni dal contagio.

Si guarisce?

La maggioranza dei pazienti con epatite B guarisce entro 6 mesi senza conseguenze. Questa forma prende il nome di epatite B acuta. La malattia conferisce un'immunità permanente. In circa il 5% dei casi può divenire cronica con rischio di evoluzione in cirrosi epatica e tumore del fegato.

Come si previene?

La trasmissione sessuale si previene con l'utilizzo del preservativo (maschile o femminile) o dental dam . La trasmissione per contatto con sangue infetto, si previene evitando lo scambio di siringhe o altra strumentazione utilizzata dai soggetti che usano sostanze stupefacenti e assicurandosi che gli strumenti utilizzati per tatuaggi/ piercing siano accuratamente sterilizzati. Inoltre è buona norma evitare l'uso in comune di oggetti quali rasoi, forbicine, spazzolini

da denti, ecc.

La **vaccinazione** dell'epatite B è compreso nelle vaccinazioni obbligatorie e il vaccino è somministrato al terzo mese di vita, a partire dal 1991.