

INFEZIONE DA HPV-CONDILOMI

L'infezione interessa soprattutto i tessuti della regione genitale, peri- anale e anale ma può localizzarsi anche nel cavo orale e faringe; è causata dal virus HPV di cui si conoscono circa 120 tipi.

Alcuni tipi di virus HPV sono associati a tumori cervicali, anali, del pene e faringei; altri sono responsabili delle manifestazioni chiamate condilomi.

CONDILOMI

Da cosa sono causati?

I condilomi o creste di gallo sono causati da un virus che si chiama Papillomavirus (HPV).

Come si trasmette l'infezione da HPV?

Il virus responsabile dei condilomi si trasmette per contatto tra cute/mucose non infette e cute/mucose infette. Il contagio può avvenire attraverso tutti i tipi di rapporto sessuale, vaginale, anale od orale e attraverso l'uso in comune di alcuni oggetti contaminati.

Come si manifestano?

Circa l'1% di coloro che hanno contratto l'infezione sviluppa delle escrescenze (condilomi) che possono comparire sulla cute o mucosa dei genitali interni ed esterni, della regione perianale/canale anale o del cavo orale. Queste escrescenze hanno una superficie irregolare, possono essere isolate o raggruppate e hanno dimensioni e forme variabili.

Dopo quanto tempo compaiono i segni o sintomi?

Non esiste un periodo di incubazione preciso. I condilomi possono manifestarsi dopo qualche mese o anche dopo anni dal contagio.

Si guarisce?

Dai condilomi si può guarire, a volte spontaneamente a volte con l'utilizzo di trattamenti specifici. In un quarto dei casi possono riformarsi. La maggior parte delle infezioni da HPV è transitoria perché il virus viene eliminato dal sistema immunitario.

Come si prevengono?

Il preservativo maschile, il preservativo femminile e il dental dam offrono una protezione parziale. Un'altra regola di prevenzione è evitare lo scambio di asciugamani o sex-tools.