

INFEZIONE DA HERPES GENITALE

Da cosa è causata?

L'infezione è causata da un virus chiamato Herpes simplex.

L'infezione è cronica, se il virus viene contratto rimane nell'organismo tutta la vita e può risvegliarsi periodicamente causando le manifestazioni che la caratterizzano.

Come si trasmette?

La trasmissione avviene per contatto con la cute/mucose non infette e cute/mucose infette.

Il picco massimo di contagiosità è durante la comparsa delle manifestazioni.

L'infezione può essere trasmessa tramite rapporti sessuali (vaginali, anali e orali) o attraverso lo scambio di oggetti usati per il piacere sessuale.

Come si manifesta?

L'infezione si manifesta con vescicole che compaiono a livello dei genitali o della regione perianale che successivamente si trasformano in ulcere superficiali, accompagnate da dolore e bruciore locale. In seguito le ulcere evolvono in croste destinate a sparire in pochi giorni.

Essendo un'infezione cronica, le manifestazioni herpetiche si possono ripresentare più volte nel corso della vita.

Dopo quanto tempo compaiono i segni o sintomi?

Possono mediamente comparire dopo 2-14 giorni dal contagio.

Si guarisce?

Non esistono terapie che possano eliminare il virus. L'infezione è cronica. È importante astenersi dall'attività sessuale fino a regressione delle manifestazioni.

Come si previene?

Il preservativo maschile, il preservativo femminile e il dental dam riducono il rischio di contagio fornendo una protezione parziale.

È importante astenersi dall'attività sessuale fino a guarigione.