

SIFILIDE

Da cosa è causata?

La sifilide è causata da un batterio che si chiama *Treponema pallidum*

Come si trasmette?

È un'infezione trasmessa in tutti i tipi di rapporto (vaginale, anale ed orale)

Come si manifesta?

Si manifesta inizialmente con una o più ulcere cutanee/mucose a livello dei genitali, della regione anale o del cavo orale (Fase Primaria).

Successivamente possono comparire eruzioni cutanee diffuse più frequentemente al tronco e ai palmi delle mani (Fase Secondaria).

Queste prime fasi possono passare inosservate e, se l'infezione non viene trattata, dopo anni può interessare organi interni, ad esempio il sistema nervoso centrale e il cuore (Fase Terziaria).

Dopo quanto tempo compaiono i segni o sintomi?

La manifestazione della fase primaria compare mediamente dopo 20 giorni dal contagio e perdura per 3-6 settimane. Se non trattata, al regredire della lesione primaria, o anche settimane dopo, compare la manifestazione cutanea secondaria. La fase terziaria si può manifestare a distanza di anni.

Si guarisce?

Una terapia antibiotica adeguata permette di controllare l'infezione, salvo nel caso in cui i danni agli organi causati dalla fase terziaria siano già presenti. Nel caso venga diagnosticata la sifilide, il trattamento va esteso ai contatti sessuali degli ultimi tre mesi dalla comparsa dei primi sintomi. È importante astenersi dall'attività sessuale fino a guarigione.

Come si previene?

Il preservativo maschile, il preservativo femminile e il dental dam riducono sensibilmente la possibilità di trasmissione dell'infezione, ma non la evitano completamente.